



Übersicht COVID-19-Impfstoffe

Ihr Spezialist für den
Direktbezug von Impfstoffen

BA.BergApotheke

Innovation | Service | Vertrauen

COVID-Impfstoffe

mRNA-Impfstoffe

Mit freundlicher
Empfehlung der



Gesellschaft für medizinische
Prävention und Kommunikation mbH



Innovation | Service | Vertrauen

Kappen- farbe	Impfstoff	Zulassung ab/ von...bis	Lagerung	Haltbarkeit ungeöffnet 2-8°C	Sonstige Haltbarkeiten	Dosen pro Vial	Anzahl Impfdosen	Auffrischung	STIKO - Hinweise
	Comirnaty® Omicron XBB.1.5 30 µg/Dosis Injektionsdispersion	12 Jahre	18 Monate -90 °C bis -60 °C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8°C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	6 Dosen je Impfdosis: 0,3ml	Einzeldosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindestabstand zu dieser: 3 Monate.	Auffrischungen empfohlen für definierte Personengruppen mit Mindestabstand zu letzten Antigenexposition von 12 Monaten, vorzugsweise im Herbst
	Comirnaty® Omicron XBB.1.5 10 µg/Dosis Konzentrat für Injektionsdispersion	5 Jahre bis 12. Geburtstag	18 Monate -90°C bis -60°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8°C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,2ml	Einzeldosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindestabstand zu dieser: 3 Monate.	Auffrischungen empfohlen für definierte Personengruppen mit Mindestabstand zu letzten Antigenexposition von 12 Monaten, vorzugsweise im Herbst
	Comirnaty® Omicron XBB.1.5 10 µg/Dosis Injektionsdispersion	5 Jahre bis 12. Geburtstag	18 Monate -90°C bis -60°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8°C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	6 Dosen je Impfdosis: 0,3ml	Einzeldosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindestabstand zu dieser: 3 Monate.	Auffrischungen empfohlen für definierte Personengruppen mit Mindestabstand zu letzten Antigenexposition von 12 Monaten, vorzugsweise im Herbst
	Comirnaty® Omicron XBB.1.5 3 µg/Dosis Konzentrat für Injektionsdispersion	6 Monate bis 4. Geburtstag	18 Monate -90 °C bis -60°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8°C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,2ml	Bei Grundimmunisierung: Dosen 1 und 2 im Abstand von 3 Wochen 3. Dosis mind. 8 Wo. nach Zweiter	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindestabstand zu dieser: 3 Monate.	Auffrischungen empfohlen für definierte Personengruppen mit Mindestabstand zu letzten Antigenexposition von 12 Monaten, vorzugsweise im Herbst
	Comirnaty® 15/15 µg/Dosis (Original/Omicron BA.4-5) Biontech/Pfizer Injektionsdispersion	12 Jahre	18 Monate -90°C bis -60°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8°C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	6 Dosen je Impfdosis: 0,3ml	Einzeldosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindestabstand zu dieser: 3 Monate.	für Auffrischimpfungen im Alter ≥ 12 Jahren präferenziell einen aktuellen Varianten-adaptierten mRNA-Impfstoff verwenden
	Comirnaty® 5/5 µg/Dosis (Original/Omicron BA.4-5) Biontech/Pfizer Injektionsdispersion	5 Jahre bis 12. Geburtstag	18 Monate -90°C bis -60°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8°C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,2ml	Einzeldosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindestabstand zu dieser: 3 Monate.	Grundimmunisierung + mind. 1 Auffrischung empfohlen bei Kindern mit Grundkrankheiten (einschl. Immundefizienz)

COVID-Impfstoffe

mRNA-Impfstoffe

Mit freundlicher
Empfehlung der



Gesellschaft für medizinische
Prävention und Kommunikation mbH

BA. BergApotheke

Innovation | Service | Vertrauen

Kappen-
farbe

Impfstoff	Zulassung ab/ von...bis	Lagerung	Haltbarkeit ungeöffnet 2-8°C	Sonstige Haltbarkeiten	Dosen pro Vial	Anzahl Impfdosen	Auffrischung	STIKO - Hinweise
Spikevax XBB.1.5 50 µg bzw. 25 µg/ Dosis	6 Monate CAVE: Einzel- dosis-Durch- stechflasche und Fertigsprit- zen nicht zur Abgabe eines Teilvolumens von 0,25mL ver- wenden!	9 Monate -50 °C bis -15°C	30 Tage ungeöffnet / inkl. Transport (max. 12 Stunden)	ungeöffnet 24h (8°C bis 25°C)	1 Je Impfdosis: ab 12 Jahren: 0,5 mL	Einzelosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindest- abstand zu dieser: 3 Monate	bei < 30-Jährigen nicht empfohlen
Injektionsdispersion Einzelosis-Durchstechflasche								
Spikevax XBB.1.5 50 µg bzw. 25 µg/ Dosis	6 Monate	9 Monate -50 °C bis -15°C	30 Tage ungeöffnet / inkl. Transport (max. 12 Stunden)	ungeöffnet 24h (8°C bis 25°C), davon 19h geöff- net (bis 25°C)	5 Je Impfdosis: bis 12. Geb.: 0,25 mL ab 12 Jahren: 0,5 mL	6 Monate ≤ 4 Jahre: Wenn kein vorherigen SARS- CoV-2-Antigenkontakt: 2 Impfungen im Abstand von 28 Tagen Wenn vorheriger SARS-CoV- 2-Antigenkontakt: 1 Dosis ab 5 Jahre: Einzelosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindest- abstand zu dieser: 3 Monate	bei < 30-Jährigen nicht empfohlen
Injektionsdispersion Mehrdosen-Durchstechflasche								
Spikevax® bivalent (Original/Omicron BA.4-5)	6 Monate	9 Monate -50°C bis -15°C	30 Tage ungeöffnet / inkl. Transport (max. 12 Stunden)	ungeöffnet 24h (8°C bis 25°C), davon 19h geöff- net (bis 25°C)	5 Dosen je Impfdosis bis 12. Geb.: 0,25 mL ab 12 Jahren: 0,5 mL	6 Monate ≤ 4 Jahre: Wenn kein vorherigen SARS- CoV-2-Antigenkontakt: 2 Impfungen im Abstand von 28 Tagen Wenn vorheriger SARS-CoV- 2-Antigenkontakt: 1 Dosis ab 5 Jahre: Einzelosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindest- abstand zu dieser: 3 Monate	bei ≤ 30-Jährigen nicht empfohlen
Injektionsdispersion Mehrdosen-Durchstechflasche								
adjuvantierter Proteinimpfstoff								
Nuvaxovid XBB.1.5 3 µg/Dosis	12 Jahre	12 Monate 2°C bis 8°C	12 Monate ungeöffnet	ungeöffnet 12h (2°C bis 25 °C) geöffnet 6h (2°C bis 25°C)	5 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	Einzelosis	Wenn vorherige Impfung gegen SARS-CoV2 erfolgte: Mindest- abstand zu dieser: 3 Monate	Anwendung während Schwanger- schaft und Stillzeit nicht empfohlen
Injektionsdispersion								

Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand dieser Information: 12/2023

BergApotheke | Pächterin Katrin Bredohl e. Kfr. | Gildestraße 75 | 49479 Ibbenbüren

T 0800 0 766766 / F 0800 0 766767

betriebsmedizin@berg-apotheke.de | www.berg-apotheke.de

